

Ihre Ärztin/Ihr Arzt muss wissen, welche Medikamente oder Präparate (auch pflanzliche) Sie einnehmen. Bringen Sie beim nächsten Arztbesuch eine Liste mit.

Was muss ich sonst noch wissen?

- Unterbrechen Sie die Behandlung nicht ohne Rücksprache mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt.
- Sie dürfen keine Johanniskraut-Präparate einnehmen. Diese Produkte können die Wirkung des Medikamentes stören. Verzichten Sie deshalb während der Behandlung auf diese Produkte.

Kontaktpersonen

Ärztin / Arzt _____

Pflegende _____

Apotheke _____

Notfall _____

Notizen

Dieses von Fachleuten zusammengestellte Merkblatt soll den Betroffenen und ihren Angehörigen den Umgang mit dem Medikament erleichtern. Es ist eine Ergänzung zur Packungsbeilage und Fachinformation.

Version: Juli 2015
Referenz: www.swissmedicinfo.ch
© Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie/Onkologiepflege Schweiz

Merkblatt für Patientinnen und Patienten

Giotrif® (Afatinib)

Giotrif® wurde von Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt für Sie ausgewählt. Sie können die Therapie positiv beeinflussen, wenn Sie die nachfolgenden Informationen beachten.

Wie sieht Giotrif® aus?



Giotrif® Filmtabletten zu 20 mg, 30 mg, 40mg, 50mg.

Filmtabletten Giotrif® 20 mg: Runde, gelblich-weiße Filmtabletten auf einer Seite mit „T20“ und der anderen mit dem Logo von Boehringer Ingelheim gekennzeichnet.

Filmtabletten Giotrif® 30 mg: Runde, dunkelblaue Filmtabletten auf einer Seite mit „T30“ und der anderen mit dem Logo von Boehringer Ingelheim gekennzeichnet.

Filmtabletten Giotrif® 40 mg: Runde, hellblaue Filmtabletten auf einer Seite mit „T40“ und der anderen mit dem Logo von Boehringer Ingelheim gekennzeichnet.

Filmtabletten Giotrif® 50 mg: Ovale, blaue Filmtabletten auf einer Seite mit „T50“ und der anderen mit dem Logo von Boehringer Ingelheim gekennzeichnet.

Wie muss Giotrif® aufbewahrt werden?

Bewahren Sie das Medikament bei Raumtemperatur auf.

Wie ist die Dosierung von Giotrif®?

Nehmen Sie die Kapseln in der Dosierung gemäss Verordnung Ihrer Ärztin/Ihres Arztes ein.

Wie nehme ich Giotrif® ein?

- Nehmen Sie die Filmpillen einmal täglich, möglichst zur gleichen Zeit mit einem Glas Wasser ein.
- Die Filmpillen müssen nüchtern, mindestens 1 Stunde vor oder 3 Stunden nach einer Mahlzeit eingenommen werden.
- Sie können die Filmpillen unzerlegt in einem halben Glas kohlenstofffreiem Wasser durch Umrühren mit einem Löffel bis zum vollständigen Zerfall auflösen und sofort einnehmen. Das Glas mit Wasser nachspülen und dieses auch trinken.

Was mache ich, wenn ich ...

... das Medikament vergessen habe?

- Die ausgelassene Dosis kann am gleichen Tag noch eingenommen werden. Zwischen der nachträglich eingenommenen Dosis und derjenigen des folgenden Tages müssen aber mindestens 8 Stunden liegen. Sonst ist die vergessene Dosis auszulassen.

... das Medikament erbrechen musste?

- Nehmen Sie keine neuen Filmpillen ein. Setzen Sie die Therapie am nächsten Tag unverändert fort.

... zu viele Kapseln eingenommen habe?

- Kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam, damit die nächste Dosis festgelegt werden kann.

Welche Nebenwirkungen sind häufig?

Was kann ich dagegen tun?

Durchfall

- Nehmen Sie frühzeitig Loperamid (z.B. Imodium®) nach Vorschrift ein.
- Achten Sie darauf, dass Sie ca. 2 Liter pro Tag trinken (z.B. Wasser, Tee, Bouillon).

Entzündung der Mundschleimhaut

- Mehrmals täglich, mindestens nach jeder Mahlzeit, Mund mit Wasser oder Salzwasser (½ – 1 Teelöffel/Liter Wasser) spülen.
- Falls keine Besserung eintritt und die Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme behindert ist, nehmen Sie Kontakt mit dem Behandlungsteam auf.

Hautausschlag/Akne

- Führen Sie die Hautpflege gemäss Anweisung des Behandlungsteams durch.
- Benutzen Sie keine Produkte ohne vorgängige Rücksprache mit Ihrem Behandlungsteam.

Lichtempfindlichkeit und Sonnenbrand

- Die Haut ist während dieser Zeit gegenüber Sonnenlicht sehr empfindlich.
- In der Sonne schützende Kleidung tragen, bleiben Sie im Freien wenn möglich im Schatten.
- Die Haut mit Sonnenschutzcreme Faktor 50 immer gut eincremen.

Nagelbettentzündung

- Kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam.

Nasenbluten

- Kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam.

Gereizte oder entzündete Augen

- Bei tränenden Augen, Augenentzündung, Lichtempfindlichkeit, verschwommenem Sehen oder Augenschmerzen benachrichtigen Sie Ihr Behandlungsteam.
- In der Sonne immer eine Sonnenbrille tragen.

In Kombination mit anderen Medikamenten können weitere Nebenwirkungen auftreten.

Wann muss ich mein Behandlungsteam informieren?

- Wenn sich der Durchfall mit der Normaldosierung des Wirkstoffes Loperamid (Imodium®) mit bis maximal 8 Kapseln/Tabletten pro Tag nicht stoppen lässt.
- Wenn Sie unter Atemnot leiden, eventuell verbunden mit Husten und Fieber.
- Wenn Sie unter anhaltenden oder anderen unklaren Beschwerden leiden.