

Come si conserva Nexavar®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Nexavar®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Nexavar®?

- Assuma le compresse a stomaco vuoto oppure consumando un pasto leggero, povero di grassi.
- Assuma la dose che Le è stata prescritta dal medico al mattino e alla sera, sempre alla stessa ora.
- Le compresse devono essere assunte intere, con abbondante acqua, senza essere né masticate né succhiate e neppure triturate.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- NON assuma la dose dimenticata. Continui con la dose successiva come d'abitudine. NON raddoppi MAI la dose per recuperare quella tralasciata.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- NON assuma il farmaco un'altra volta. Attenda la sera, risp. il mattino, per proseguire con la terapia come d'abitudine.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Avverta immediatamente la Sua équipe curante.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Sanguinamenti (dal naso, dalle gengive)

- Avvisi l'équipe curante.

Eruzioni e/o arrossamenti cutanei

- Curi la pelle come consigliato.
- Se ritiene opportuno l'uso di altri prodotti, lo concordi con l'équipe curante.

Sindrome mani-piedi

- Applichi fin dall'inizio della terapia una crema o una lozione grassa sulle mani e sui piedi.
- Eviti forti pressioni (p. es. scarpe strette).

- Eviti temperature estreme (p. es. contatto prolungato con acqua fredda o calda).
- Interrompa la terapia e informi l'équipe curante in presenza di dolori e vescicole.

Nausea/vomito

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) che Le sono stati prescritti.

Diarrea

- Assuma per tempo la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Cerchi di bere circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Mal di testa, dolori alle ossa

- È consentita l'automedicazione con antidolorifici reperibili senza ricetta come, per esempio, la sostanza attiva paracetamolo.
- Prenda contatto con la Sua équipe curante.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule al giorno) normalmente consentita della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®)
- Sintomi d'infezione quali febbre, brividi, mal di gola o tosse e raffreddore
- Alterazioni della pelle (eruzioni cutanee, arrossamenti, prurito)
- Aumento o persistenza della stanchezza
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta

Il Suo medico deve sapere quali altri farmaci o rimedi (anche di erboristeria) assume. Ne allestisca un elenco da consegnare al medico in occasione della prossima visita medica.