

Come si conserva Sutent®?

Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Sutent®?

Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Sutent®?

- Assuma la dose giornaliera che Le è stata prescritta dal medico una volta al giorno, se possibile sempre alla stessa ora, con un bicchiere d'acqua.
- Assuma le capsule a stomaco vuoto oppure consumando un pasto leggero, povero di grassi.
- NON assuma MAI la dose giornaliera prescritta due volte nello stesso giorno.
- NON divida, né apra o riduca in polvere le capsule, ma le deglutisca intere, senza masticarle.

Che cosa faccio se ...

... ho dimenticato di assumere il farmaco?

- NON assuma più tardi la dose dimenticata. Attenda il giorno successivo per proseguire con la terapia come d'abitudine.
- NON raddoppi MAI la dose per recuperare quella tralasciata.
- Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.

... ho vomitato il farmaco?

- NON assuma il farmaco un'altra volta.
- Attenda il giorno successivo per proseguire con la terapia come d'abitudine.

... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?

- Avverta immediatamente la Sua équipe curante.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?

Che cosa posso fare per contrastarli?

Sanguinamenti (dal naso, dalle gengive)

- Avvisi l'équipe curante.

Eruzioni cutanee

- Curi la pelle come consigliato.
- Se ritiene opportuno l'uso di altri prodotti, lo concordi con l'équipe curante.

Nausea, vomito, inappetenza

- Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) che Le sono stati prescritti.

Diarrea

- Assuma per tempo la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo le modalità di somministrazione prescritte dal medico.
- Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco.
- Beva circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo).

Infiammazione delle mucose orali

- Risciacqui la bocca con acqua o acqua salata più volte al giorno e dopo ogni pasto (1/2-1 cucchiaino per 1 litro d'acqua).
- Contatti l'équipe curante qualora l'infiammazione non regredisce e/o Le impedisse di bere e di mangiare.

Ipertensione

- Si faccia misurare la pressione almeno una volta alla settimana. Prenda contatto con il Suo medico se la pressione è superiore a 145/85.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali.

Che cosa devo segnalare all'équipe curante?

- Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima (8 capsule al giorno) normalmente consentita della sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®)
- Febbre oltre i 38 °C
- Aumento o persistenza della stanchezza
- Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta

L'assunzione di un qualsiasi altro farmaco deve essere comunicata in precedenza al proprio oncologo. Ciò vale anche per i medicinali acquistati senza ricetta medica, di propria iniziativa.

Che cos'altro devo sapere?

- Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa.
- Il pompelmo e l'erba di San Giovanni (o iperico) possono ridurre l'efficacia di Sutent®. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia.